

ANNAMITE CRESTED ARGUS

ECOLOGY

Distribution & Range: Lao PDR and Viet Nam; endemic to the Annamite Mountains
Habitat: Primary and secondary evergreen forest
Diet: Most likely eat invertebrates, mollusks, amphibians, small reptiles, shoots, leaves, fruits, and fungi


CONSERVATION

Conservation status:
Critically Endangered
Major Threats: Illegal trade-driven hunting with snare traps, and habitat loss
Conservation Action:
Research and monitoring, and habitat protection

ACTIVITY & SOCIAL TRAITS

Social Structure: Unknown, but most likely live in bonded pairs
Activity: Unknown
Reproduction: Most likely form monogamous pair bonds; males most likely perform display behaviors during courtship
Clutch Size: Lay 1-2 eggs
Incubation: 25 days

DISTRIBUTION



CLASS Aves

ORDER Galliformes

FAMILY Phasianidae

GENUS Rheinardia

SPECIES ocellata



CRITICALLY ENDANGERED

RED LIST

NE

DD

LC

NT

VU

EN

CR

EW

EX

EXTINCT IN THE WILD

EXTINCT

Species Protection Status in Laos: Prohibition Category 1*

*Protection Category 1: Rare, near extinct, high-value species of special importance in the development of social-economic, environmental, educational scientific research. **It is prohibited to hunt this species anywhere and at any time in Laos**

PHYSICAL TRAITS

Family: Phasianidae: a heavy, ground-dwelling bird
Weight: 1.5 kg
Appearance: Black and brown plumage with brown and white spots, a crest on the head, and a very long tail with 12 feathers

FUN FACT

The tail feathers of male **Annamite crested argus** contain the longest and widest of all bird feathers, and they have the **longest "train"** of tail feathers **of all birds**





ນົກວູວ່າວ (ນົກຢູ່ທອງ)

ນິເວດວິທະຍາ

ພື້ນທີ່ອາໄສ: ລາວ ແລະ ທວຽດນາມ; ມີຖຸນກຳເມີນໃນເຂດສາຍພຫວງ
ແຫ່ງທີ່ຢ້າໄສ: ບ້າຊັ້ນໜຶ່ງ, ແລະ ບ້າຊັ້ນສອງ
ການກິນອາຫານ: ກິນສັດທີ່ມີກູ່ດູກສັນຫຼັງ, ຈຳພວກຫອຍ, ສັດເຄິງບົກເຄິ່ງນໍາ, ສັດເລືອຄານ ຂະໜາດນ້ອຍ, ຍອດໄມ້, ໃບໄມ້, ໝາກໄມ້ ແລະ ເຫັດລາ

ການອະນຸລັກ

ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ:

ມີຄວາມສ່ຽງຂັ້ນວິກິດຕໍ່ການສູນພັນ

ໄພຂັ້ນຊັ້ນຕົ້ນດຳ; ການລັກລອບລ່າສັດປ່າໂດຍ ການໃສ່ແຮ້ວ ທີ່ຂັບເຂືອນດ້ວຍການຊື້ຊາຍ ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສູນເສຍແຫ່ງທີ່ຢ້າໄສ

ການປະຕິບັດການອະນຸລັກ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການປົກປັກຮັກສາແຫ່ງທີ່ຢ້າໄສ

ພິດຕິກຳ ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມ

ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ: ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ແມ່ນອນ, ແຕ່ອາດຈະຢູ່ເປັນຄູ່


ພິດຕິກຳ: ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ການສືບພັນ: ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຄູ່ຜົວໜຶ່ງ ເມຍດຽວ, ໂຕຜູ້ຈະສະແດງພິດຕິກຳໃນ ການກ້ຽວພາລາສີ

ຈຳນວນໄຂ້ໃນຮັງ: ອອກໄຂ້ຈຳນວນ 1-2 ແ່ວຍ

ໄລຍະຟັກໄຂ້: 25 ວັນ

ພື້ນທີ່ອາໄສ



ຂັ້ນ Aves

ອັນດັບ Galliformes

ຕະກຸນ Phasianidae

ສະກຸນ Rheinardia

ຊະນິດ ocellata



CR
CRITICALLY
ENDANGERED

EW
EXTINCT IN THE WILD
EX
EXTINCT

ສະພາບການປົກປັກຮັກສາພັນສັດປ່າໃນລາວ: **ປະເພດຫວັງທ້າມ 1***

ປະເພດຄຸ້ນຄອງ I: ຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໄກສູນພັນ, ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ. ທ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການລ່າສັດຊະນິດນີ້ຕາມອໍາເພີໃຈໃນລາວ

ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ຕະກຸນ: Phasianidae, ເປັນນົກທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງໝ້າດິນ

ນໍ້າໝັກ: 1.5 ກລ

ລັກສະນະ: ມີຂົນສິນ້າຕານດຳ ພ້ອມມີ ຈຸດສິນ້າຕານ ແລະ ສີຂາວ, ມີຫອນ ແລະ ທາງຍາວ ໂດຍມີຂົນ 12 ກ້ານ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ຂົນທີ່ຫາງຂອງໂຕຜູ້ປະກອບມີຂົນ ທີ່ຢ້າວທີ່ສົດ ແລະ ກວ້າງທີ່ສົດ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດານົກທັງໝົດ ແລະ ມີ "ແຖວ" ຂົນຢ້າວກວ່າໝູ້ໃນ ບັນດານົກທຸກຊະນິດ.

