



ASIATIC BLACK BEAR

ECOLOGY

Distribution & Range: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Iran, Japan, North Korea, South Korea, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Pakistan, Russia, Taiwan, Thailand, and Viet Nam

Habitat: Variety of forest habitats, mainly broadleaf and coniferous. Habitats and elevation may change seasonally

Diet: Generalist omnivores; eat shoots, leaves, forbs, insects, fruit, nuts, and occasionally meat

CONSERVATION

Conservation status:

Vulnerable

Major Threats: Targeted hunting for the national and international trade of body parts sold for traditional medicine and live animals for the pet trade, and habitat loss

Conservation Action: Research and monitoring, habitat protection, monitoring of national and international trafficking, education, rescue and rehabilitation, and reintroduction

ACTIVITY & SOCIAL TRAITS

Social Structure: Solitary, apart from breeding and mothers with cubs


Activity: Both terrestrial and arboreal, and both diurnal and crepuscular. Bears in northern ranges hibernate from October–December, as well as pregnant females

Reproduction: Breeding season from June–August

Gestation: 5–6 months

Number of offspring: 1–2

DISTRIBUTION



CLASS Mammalia

ORDER Carnivora

FAMILY Ursidae

GENUS Ursus

SPECIES
Thibetanus



Species Protection Status in Laos: Prohibition Category 1*

*Protection Category 1: Rare, near extinct, high-value species of special importance in the development of social-economic, environmental, educational scientific research. **It is prohibited to hunt this species anywhere and at any time in Laos**

PHYSICAL TRAITS

Family: Ursidae: a dog-like carnivoran “bear”

Weight: Males: 60–200 kg, females: 40–125 kg

Appearance: Black fur with a white patch on the chest, large bell-shaped ears, and a small tail

FUN FACT

Asiatic black bears are one of the largest arboreal mammals in the world, and spend up to 15% of their time in trees





ໝົມຄວາຍ (ໝົດຳ)

ນິເວດວິທະຍາ

ພື້ນທີ່ອາໄສ: ອັນພັກນີ້ສຖານ, ພຸຖານ, ບັງກະລາເດດ, ກຳປູເຈຍ, ຈິນ, ອິນເດຍ, ອີຫຼ່ານ, ອີບຸນ, ທັກທີ່ເໜືອ, ທັກທີ່ໃຕ້, ລາວ, ມຽນມາ, ແມປານ, ປາກີສຖານ, ຮສຊຍ, ໄຕ້ຫວັນ, ໄທ ແລະ ຫົວຮັດນາມ
ແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ: ອາໄສຢ່າງຕາມປ່າໄມ້ຫຼາຍປະເພດ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນປ່າໄມ້ໃບຫຍ່ ແລະ ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ; ແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງອາດຈະປ່ຽນແປ່ງຕາມລະດູການ; ອາໄສຢູ່ຫຼ້າມ້າດິນ ແລະ ເທິງຕົ້ນໄມ້.
ການກິນອາຫານ: ກິນທຸກຢ່າງເປັນອາຫານທັງພື້ນ ແລະ ສັດ; ກິນຍອດໄມ້, ໃບໄໝ, ແມ່ງໄໝ, ໜາກໄໝ, ຖົວ ແລະ ຊື້ນສັດເປັນບາງຄັ້ງຄາວ


ການອະນຸລັກ

ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ: ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ສູນພັນໄພຂຶ້ນຊູ້ຕົ້ນດຳ: ການລ່າສັດແບບກຳນົດເປົ້າຫາຍຸເພື່ອການຊີ້ຂາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບສິນສ່ວນຂອງຮູ້ງກາຍທີ່ຊີ້ຂາຍເພື່ອຜະລິດເປັນຢ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ການຊີ້ຂາຍສັດທີ່ຢູ່ມີຊີວິດເພື່ອເປັນສັດລ້ຽງ ແລະ ການສູນເສຍແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ
ການປະຕິບັດການອະນຸລັກ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການປົກປັກຮັກສາແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຕິດຕາມການຊີ້ຂາຍຜິດກົດໝາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການສຶກສາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພື້ນຟູສະພາບຊີວິດ ແລະ ການປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ

ພິດຕິກຳ ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມ

ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ: ມັກຢູ່ແບບໂດດດຸງວ, ຈະມີຄູ່ກໍຕໍ່ເມືອນໃນລະດູປະສົມພັນ ແລະ ແມ່ທີ່ມີລົກນ້ອຍ.
ພິດຕິກຳ: ອອກຫາກິນໃນຍາມກາງເວັນ ແລະ /ທີ່ຊົ່ງຄ້າຍແລງ (ຊ່ວງຕາເວັນກຳລັງຈະຕົກດິນ). ໜີ້ມີເຂດພາກເໜືອຈະຈຳສິນແຕ່ເດືອນຕຸລາຫາເດືອນທັນວາ ແລະ ໂຕແມ່ທີ່ຖືພາກຈຳຈຳສິນເຊັນກັນ.
ການສືບພັນ: ລະດູປະສົມພັນຈະເລີມແຕ່ເດືອນນິຖຸນາທາເດືອນສິງຫາ
ການຖືພາ: 5-6 ເດືອນ
ຈຳນວນລູກ: 1-2 ໂຕ

ພື້ນທີ່ອາໄສ



ຊັ້ນ Mammalia

ອັນດັບ Carnivora

ຕະກຸນ Ursidae

ສະກຸນ Ursus

ຊະນິດ Thibetanus



ສະພາບການປົກປັກຮັກສາພັນສັດປ່າໃນລາວ: ປະເພດຫວາໜ້າ 1*

ປະເພດຄົ່ນຄົງ 1: ຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ສູນພັນ, ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິງແວດຸລ້ອນ, ການສຶກສາຄົ່ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການລ່າສັດຊະນິດນິຕາມອໍາເພີໃຈໃນລາວ

ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ຕະກຸນ: Ursidae, ອັນດັບ carnivoran "ໝົດ" ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືໝົງ

ນ້ຳໜັກ: ໂຕຜູ້: 60-200 ກລ, ໂຕແມ່: 40-125 ກລ

ລັກສະນະ: ມີຂົນຍາວລຽບສີດຳຫຼັມລໍາໂຕ ແລະ ແຜ່ນສີຂາວຢູ່ບໍລິເວນໜ້າເອັກ, ມີຫຼູເປັນຮູບລະຄົງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຫາງນ້ອຍ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ໝົມຄວາຍ (ໝົດຳ) ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍານົມປະເພດໝົງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສົດຂອງໂລກ ທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ໄຊເວລາຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ດົນເຖິງ 15%

