



CHINESE PANGOLIN

ECOLOGY

Distribution & Range: Bangladesh, Bhutan, China, Hong Kong, India, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Taiwan, Thailand, and Viet Nam

Habitat: Primary/secondary tropical forests, limestone, bamboo, broad-leaf and coniferous forests, grasslands, and agricultural fields.

Diet: Insectivores; eat ants and termites.

CONSERVATION

Conservation status:

Critically Endangered. Pangolins are the most trafficked mammal in the world. Their scales are particularly sought after for the Chinese traditional medicine

Major Threats: Targeted hunting for the national and international trade for traditional medicine and bushmeat, and habitat loss

Conservation Action: Research and monitoring, habitat protection, monitoring of national and international trafficking, education, rescue and rehabilitation, and reintroduction

ACTIVITY & SOCIAL TRAITS

Social Structure: Solitary, only come together to breed


Activity: Nocturnal, spend their time foraging and burrowing.; Terrestrial, but fully capable of climbing.

Reproduction: Breeding season in April and May; offspring are carried on their mother's backs for 3-4 months

Gestation: Around 6 months

Number of offspring: 1

DISTRIBUTION



CLASS Mammalia

ORDER Pholidota

FAMILY Manidae

GENUS *Manis*

SPECIES *Pentadactyla*



Species Protection Status in Laos: **Prohibition Category 1***

**Protection Category 1: Rare, near extinct, high-value species of special importance in the development of social-economic, environmental, educational scientific research. It is prohibited to hunt this species anywhere and at any time in Laos*

PHYSICAL TRAITS

Family: Manidae, three genera of pangolins

Weight: 2-7 kg

Appearance: Body covered in grayish brown scales, with a pointed nose and a long scaly tail

FUN FACT

Pangolins are covered in scales that are made of **keratin**, which is the same material as **human fingernails!** When threatened, pangolins **roll themselves** into an armored ball.





ລິ້ນຄວາຍ

ນິເວດວິທະຍາ

ພື້ນທີ່ອາໄສ: ບັງກະລາເດດ, ພູຖານ, ຈີນ, ຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ເນປານ, ໄຕ້ຫວັນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ: ອາໄສຢູ່ປ່າຊັ້ນໜຶ່ງ/ປ່າຊັ້ນສອງ, ປ່າຫີນປູນ, ປ່າໃຜ່, ປ່າໄມ້ໃບໃຫຍ່ ແລະ ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ, ທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ທົ່ງນາ. ອາໄສຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ແຕ່ສາມາດປີນໄຕ້ໄດ້ເຕັມທີ່

ການກິນອາຫານ: ກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານ, ກິນມົດ ແລະ ປວກ


ການອະນຸລັກ

ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ:

ມີຄວາມສ່ຽງຂັ້ນວິກິດຕໍ່ການສູນພັນ. ລິ້ນຄວາຍ ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ມີການຊີ້ຂາຍຜິດກົດໝາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເກັດລິ້ນຖືເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການພິເສດ ສຳລັບເຮັດເປັນຢາພື້ນເມືອງຈີນ **ໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍ:** ການລ່າສັດແບບກຳນົດເປົ້າໝາຍເພື່ອການຊີ້ຂາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສຳລັບຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຊິນສັດປ່າ ແລະ ການສູນເສຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ການປະຕິບັດການອະນຸລັກ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຕິດຕາມການຊີ້ຂາຍຜິດກົດໝາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການສຶກສາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຟື້ນຟູສະພາບຊີວິດ ແລະ ການບໍ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ

ພື້ນທີ່ອາໄສ



NOT EVALUATED	DATA DEFICIENT	LEAST CONCERN	NEAR THREATENED	VULNERABLE	ENDANGERED	CRITICALLY ENDANGERED	EXTINCT IN THE WILD	EXTINCT
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

ຊັ້ນ Mammalia

ອັນດັບ Pholidota

ຕະກຸນ Manidae

ສະກຸນ Manis

ຊະນິດ Pentadactyla



ສະພາບການປົກປັກຮັກສາພັນສັດປ່າໃນລາວ: ປະເພດຫວງຫ້າມ I *

*ປະເພດຄຸ້ມຄອງ: ຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ສູນພັນ, ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການລ່າສັດຊະນິດນີ້ຕາມອຳເພີໃຈໃນລາວ

ພຶດຕິກຳ ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມ

ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ: ມັກຢູ່ແບບໂດດດ່ຽວ, ຈະມີຄູ່ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໃນລະດູປະສົມພັນເທົ່ານັ້ນ
ພຶດຕິກຳ: ອອກຫາກິນໃນຍາມກາງຄືນ, ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໃນການຫາອາຫານ ແລະ ຂຸດພົ່ງ
ການສືບພັນ: ເຊິ່ງເດືອນເມສາຫາພຶດສະພາຈະເປັນລະດູປະສົມພັນຂອງລິ້ນຄວາຍ; ໂຕແມ່ຈະເຈ່ຍລູກໄວ້ເທິງຫຼັງເປັນເວລາ 3-4 ເດືອນ
ການຖືພາ: ປະມານ 6 ເດືອນ
ຈຳນວນລູກ: 1 ໂຕ

ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ຕະກຸນ: Manidae, ລິ້ນສາມສາຍພັນ
ນ້ຳໜັກ: 2-7 ກລ
ລັກສະນະ: ລຳໂຕຖືກປົກຫຸ້ມດ້ວຍເກັດສີນ້ຳຕານແກມເທົາ, ດັງແຫຼມ ແລະ ຫາງມີສະເກັດຍາວ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ລຳໂຕຂອງລິ້ນຄວາຍຖືກປົກຫຸ້ມດ້ວຍເກັດທີ່ສ້າງຈາກເຄຣາຕິນ, ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸຊະນິດດຽວກັນກັບເລັບຂອງມະນຸດ! ພື້ອຖືກຄຸກຄາມ, ລິ້ນຈະມ້ວນຕົວເຂົ້າກັບຄືໝາກບານຫຸ້ມເກາະ

