



GREAT HORNBILL

ECOLOGY

Distribution & Range: Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailand, and Viet Nam

Habitat: Wet evergreen and mixed deciduous forests

Diet: Fruit, figs, eggs, amphibians, reptiles, insects, small mammals and small birds

DISTRIBUTION



CONSERVATION

Conservation status:

Vulnerable

Major Threats: Targeted hunting for local consumption or the national and international trade, and habitat loss

Conservation Action: Research and monitoring, and habitat protection

ACTIVITY & SOCIAL TRAITS

Social Structure: Live in small parties to large groups of birds. Pairs form monogamous bonds

Activity: Diurnal; are sedentary during breeding season but have a larger range for the rest of the year

Reproduction: Breeding season is January to April. Pairs sing duets together and build nests in hollow tree cavities.

Clutch Size: 1-2 chicks

Incubation: 40 days

PHYSICAL TRAITS

Family: Bucerotidae: casqued Asian and African tropical birds

Weight: 2-4 kg

Appearance: Black with white-tipped feathers, and a yellow feathered head with a prominent casque on top of the bill. Males have red eyes and females have blue eyes.

CLASS Aves

ORDER Bucerotiformes

FAMILY Bucerotidae

GENUS Buceros

SPECIES bicornis



Species Protection Status in Laos: Prohibition Category 1*

*Protection Category 1: Rare, near extinct, high-value species of special importance in the development of social-economic, environmental, educational scientific research. **It is prohibited to hunt this species anywhere and at any time in Laos**

FUN FACT

During nesting, the female **great hornbill** will seal herself into a **cavity nest** using feces and remains inside during incubation. It is the male's job to bring food for her and the chick.





ນິກກົກຄໍຄຳ

ນິເວດວິທະຍາ

ພື້ນທີ່ອາໄສ: ບັງກະລາເດດ, ພູຖານ, ກຳປູເຈຍ, ຈິນ, ອິນເດຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມှာ, ເມປານ, ຖ ແລະ ຫວຽດນາມ
ແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ: ປ່າດົງດີບຊຸ່ມ ແລະ ບ້າປະສົມໃບພັດ

ການກິນອາຫານ: ໝາກໄມ້, ໝາກເຕື່ອ, ໄຂ່, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ, ສັດເລືອຄານ, ແມ່ງໄມ້, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ແລະ ນົກນ້ອຍ.

ການອະນຸລັກ

ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ:

ມີຄວາມສ່ຽງໄກສູນພັນ

ໄພຂໍ້ມູນຊື່ຕົ້ນນຳດຳ: ການລ່າສັດແບບກໍານົດເປົາມາຍເພື່ອການບໍລິໂພກໃນທ້ອງຖິນ ຫຼືຊີ້ຂາຍທັງພາຍໃນ ດຸລະ ຕ່າງປະເທດ, ແລະ ການສູນເສຍແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ການປະຕິບັດການອະນຸລັກ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຖຸນຕິດຕາມ, ແລະ ການປົກປັກຮັກສາແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ


ພຶດຕິກຳ ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມ

ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ: ອາໄສຢູ່ເປັນກໍມະຊະໜາດນ້ອຍຈົນເຖິງກຸມໃຫຍ່. ມີຄູແບບຜົວໜຶ່ງເມຍດຽວ

ພຶດຕິກຳ: ອອກຫາກິນໃນຍາມກາງເວັນ; ຈະອາໄສຢູ່ບ່ອນເກົາໃນຊ່ວງລະດຸມະສົມພັນ ແຕ່ກຳຈະຍ້າຍອອກໄປໄກຂຶ້ນໃນຊ່ວງທີ່ເຫຼືອຂອງປີ

ການສືບພັນ: ເດືອນນັກງອນຫາເມສາຖືເປັນລະດຸປະສົມພັນຂອງນົກກົກຄໍຄຳ. ພວກມັນນັກຮ້ອງເປັນຄູ່ ແລະ ສ້າງຮັງໃນໂພງຕົ້ນໄມ້ຈຳນວນໃຂ້ໃນຮັງ: ລູກນົກ 1-2 ໂຕໄລຍະຟິກໃຂ້: 40 ວັນ

ພື້ນທີ່ອາໄສ



ຂັ້ນ Aves

ອັນດັບ
Bucerotiformes

ຕະກຸນ
Bucerotidae

ສະກຸນ
Buceros

ຊະນິດ
bicornis



ສະພາບການປົກປັກຮັກສາພັນສັດປ້າໃນລາວ: **ປະເພດຫວັງທ້າມ 1***

*ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ລ: ຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໄກສູນພັນ, ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ້ງແວດລ້ອມ, ການສັກສາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ທ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການລ່າສັດຊະນິດນີ້ຕາມອໍາເພີໃຈໃນລາວ

ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ຕະກຸນ: Bucerotidae, ນົກເຂດຮ້ອນອ້າຊີ້ ແລະ ອາຟຣິກກາທີ່ມີໂໝກແຂງນໍ້າພັກ: 2-4 ກລ

ລັກສະນະ: ມີສິດໍາພ້ອມປາຍຂົນສິຂາວ, ແລະ ຫົວມີສີເຫຼືອງ ທັງມີໂໝກແຂງລ້າຍຄື່ໝວກປາກົດຢູ່ເທິງສົບ. ໂຕຜູ້ຈະມີຕາສີແດງສ່ວນໂຕແມ່ມີຕາສີຟ້າ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ໃນຊ່ວງກໍາລັງເຮັດຮັງ, ໂຕແມ່ຈະຂັ້ງຕົນເອງໄວ້ໃນຮັງໂດຍໃຊ້ຂີຫາໃສ່ຮັງ ແລະ ຍັງຢູ່ໃນຮັງໃນຊ່ວງຟິກໄຂ່. ໂຕຜູ້ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຊອກຫາອາຫານມາໃກ້ເມຍ ແລະ ລູກ.

