




NORTHERN BUFF CHEEKED GIBBON

ECOLOGY

Distribution & Range: Cambodia, Lao PDR and Viet Nam; endemic to the Annamite Mountains
Habitat: Broadleaf evergreen and semi-evergreen forests
Diet: Frugivorous, but also eat leaves, shoots, flowers, and sometimes meat

DISTRIBUTION



CLASS Mammalia

ORDER Primates

FAMILY Hylobatidae

GENUS Nomascus

SPECIES
annamensis

CONSERVATION

Conservation status:

Endangered

Major Threats: Targeted hunting for local consumption or for national and international trade (for traditional medicine, bush meat, and the pet trade, and habitat loss)

Conservation Action: Research and monitoring, habitat protection, education, rehabilitation, and reintroduction



ACTIVITY & SOCIAL TRAITS

Social Structure: Monogamous family groups

Activity: Arboreal and diurnal; spend their time resting, feeding, socializing, and travelling

Reproduction: Most likely form monogamous pair bonds

Gestation: Most likely 200-212 days

Number of offspring: Most likely 1

PHYSICAL TRAITS

Family: Hylobatidae: a lesser ape or "gibbon"

Weight: 7-9 kg

Appearance: Males are black with reddish-tan cheeks, and females are tan with black faces. They have very long arms and lack a tail

FUN FACT
Male and female gibbons **sing duets** together



ທະນີແກ້ມເຫຼືອງຖິ່ນເໜືອ

ນິເວດວິທະຍາ

ພື້ນທີ່ອາໄສ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ; ມີຖິ່ນກໍາເນີດໃນເຂດສາຍພູຫຼວງ
ແຫຼ່ງທີ່ຢ່າໄສ: ເປົາໄນ້ໃບທີ່ຢ່າໄສ ແລະ ປ່າເຄິ່ງດົງ ດິບ; ອາໄສຢູ່ເທິງຕົ້ນໃໝ່
ການກິນອາຫານ: ກິນໝາກໄມ້ເປັນອາຫານ ຫຼັກ, ແຕ່ກຸ້ມ້າງກິນໃບມື້, ໜໍ້, ດອກໄມ້ ແລະ ບາງ ຄັງກິນຊັ້ນນຳອີກ.

ການອະນຸລັກ

ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ:


ໄກສົນພັນ
ໄຟຂັ້ນຊຸດຕົ້ນຕໍ່: ການລ່າສັດແບບກຳນົດປົ້າເໝາຍ ເພື່ອການບໍລິໂພກໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ການຊື່ຂາຍຫັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບໃຊ້ເປັນຢາ ພື້ນເມືອງ, ການຊື່ຂາຍເພື່ອເປັນສັດລ໊ຽງ ຫຼື ເພື່ອສະໜອງຊົນສັດປ່າ) ແລະ ການສູນເສຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ການປະຕິບັດການອະນຸລັກ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການປັກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທີ່ຢ່າໄສ, ການສຶກສາ, ການຝຶນພູ ແລະ ການປ່ອຍສັດປ່າຄົນສູ່ທຳມະຊາດ

ພຶດຕິກຳ ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມ

ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ: ເປັນກຸ່ມຄອບຄົວທີ່ມີຜົວໜຶ່ງເມຍດຽວ
ພຶດຕິກຳ: ອອກຫາກິນໃນຍາມກູງເວັນ; ໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນ, ກິນອາຫານ, ເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ເລັກທີ່ນີ້
ການສືບພັນ: ເສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຄວາມສໍາພັນ ແບບຜົວໜຶ່ງເມຍດຽວ
ການຖື່ພາ: ສູງສຸດປະມານ 200-212 ວັນ
ຈຳນວນລູກ: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 1 ໂຕ

ພື້ນທີ່ອາໄສ



ຊັ້ນ Mammalia

ອັນດັບ Primates

ຕະກຸນ Hylobatidae

ສະກຸນ Nomascus

ຊັ້ນ annamensis



ຮະພາບການປັກປັກຮັກສາພັນສັດປ່າໃນລາວ: ປະເພດທຸວ່າທຳ 1*

ປະເພດຄົ້ນຄອງ 1: ຂະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໄກສົນພັນ, ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາຄົນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ. ທຳມະຊາດໃຫ້ມີການລ່າສັດຊະນິດນີ້ຕາມອໍາເພີໃຈໃນລາວ

ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ຕະກຸນ: Hylobatidae, ລົງບໍ່ມີຫາງ ຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື "ທະນີ"

ນໍ້າໝັກ: 7-9 ກລ

ລັກສະນະ: ໂຕຜູ້ຈະມີສິດໍາ, ແກ້ວມືສິນ້າຕານ ແດງ ແລະ ໂຕແມ່ຈະມີສິຄົມ ແລະ ໃບໜ້າເປັນສິດໍາ. ທະນີແກ້ມເຫຼືອງຖິ່ນເໜືອມີແຂນຍາວ ແລະ ບໍ່ມີຫາງ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ທະນີແກ້ມເຫຼືອງຖິ່ນເໜືອ ທັງໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ມັກຈະ ຮ້ອງຄູ່ກັນ

