



OWSTON'S CIVET

ECOLOGY

Range: Lao PDR and Viet Nam; primary range is in the Annamite mountains

Habitat: Evergreen, semi-evergreen, and wet evergreen forests

Diet: Most likely insectivorous, with a diet of primarily earthworms

CONSERVATION

Conservation Status:

Endangered

Major Threats: Illegal trade-driven hunting with snare traps, targeted hunting for local consumption or trade, and habitat loss

Conservation Action: Research and monitoring, ex-situ species management, habitat protection, and education

ACTIVITY & SOCIAL TRAITS

Social Structure: Solitary

Activity: Nocturnal

Reproduction: Breeding season in late January

Gestation: 3 months

Number of Offspring: 1-3

DISTRIBUTION



CLASS Mammalia

ORDER Carnivora

FAMILY Viverridae

GENUS *Chrotogale*

SPECIES *owstoni*



Species protection status in Laos: Prohibition Category 1*

*Protection Category 1: Rare, near extinct, high-value species of special importance in the development of social-economic, environmental, educational scientific research. **It is prohibited to hunt this species anywhere and at any time in Laos**

PHYSICAL TRAITS

Family: Viverridae: a small to medium-sized feliform mammal

Weight: 2-3 kg

Appearance: Greyish-brown body with black spots and markings on its back and tail

FUN FACT

From observing **Owston's civets** in captivity, it appears that their favorite food is **earthworms!**





ເຫງັນລາຍພາດກອນ

ພື້ນທີ່ອາໄສ



ສະພາບການປົກປັກຮັກສາພັນສັດປ່າໃນລາວ: **ປະເພດຫວາຫ້າມ 1***

*ປະເພດຄຸ້ມຄອງ 1: ຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ສູນພັນ, ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

ຊັ້ນ Mammalia

ອັນດັບ Carnivora

ຕະກຸນ Viverridae

ສະກຸນ *Chrotogale*

ຊະນິດ *owstoni*

ນິເວດວິທະຍາ

ພື້ນທີ່ອາໄສ: ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ; ພື້ນທີ່ອາໄສຕົ້ນຕໍແມ່ນຢູ່ບໍລິເວນສາຍພູຫຼວງ.

ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ: ປ່າດົງດິບ, ປ່າເຄິ່ງດົງດິບ ແລະ ປ່າດົງດິບຊຸ່ມ

ການກິນອາຫານ: ເກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍກິນອາຫານປະເພດຂີ້ກະເດືອນເປັນຫຼັກ

ການອະນຸລັກ

ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ:

ໃກ້ສູນພັນ

ໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍ: ການລັກລອບລ່າສັດປ່າໂດຍການໃສ່ແຮ້ວ ທີ່ຂັບເຂື່ອນດ້ວຍການຊີ້ຂາຍຜູ້ດຶກດູໝາຍ, ການລ່າສັດແບບກຳນົດເປົ້າໝາຍເພື່ອການບໍລິໂພກ ຫຼື ຊີ້ຂາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສູນເສຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ການປະຕິບັດການອະນຸລັກ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການຄຸ້ມຄອງພັນສັດປ່ານອກຖິ່ນ, ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການສຶກສາ

ພຶດຕິກຳ ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມ

ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ: ມັກຢູ່ແບບໂດດດ່ຽວ

ພຶດຕິກຳ: ອອກຫາກິນໃນຍາມກາງຄືນ

ການສືບພັນ: ລະດູປະສົມພັນແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນມັງກອນ

ການຖືພາ: 3 ເດືອນ

ຈຳນວນລູກ: 1-3 ໂຕ

ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ຕະກຸນ: Viverridae; ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມເຟລິຟິເມຍ

ຊະໜາດນ້ອຍຫາຂະໜາດກາງ

ນ້ຳໜັກ: 2-3 ກລ

ລັກສະນະ: ລຳໂຕມີສີນ້ຳຕານເທົາ, ມີຈຸດດຳ ແລະ ມີຮອຍກ່ານທີ່ຫຼັງ ແລະ ທາງ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ຈາກການສັງເກດເຫງັນລາຍພາດກອນທີ່ຖືກກັກຂັງປາກົດວ່າ ອາຫານທີ່ພູວກມັນມັກກິນນັ້ນແມ່ນຂີ້ກະເດືອນ!

