



# RED SHANKED DOUC

## ECOLOGY

**Distribution & Range:** Cambodia, Lao PDR and Viet Nam; endemic to the Annamite Mountains  
**Habitat:** Evergreen, mixed broadleaf/coniferous, and limestone forests  
**Diet:** Folivorous, eat leaves, fruits, seeds, flowers, and bark



## CONSERVATION

**Conservation status:** Critically Endangered  
**Major Threats:** Targeted hunting for local consumption or the national and international trade (for traditional medicine, bushmeat, and pet trade), and habitat loss  
**Conservation Action:** Research and monitoring, education, and habitat protection

## ACTIVITY & SOCIAL TRAITS

**Social Structure:** Most likely one-male groups with 6-18 individuals, with fission-fusion (animals sometimes change groups). Males are dominant over females  
**Activity:** Diurnal and arboreal; Spend most of their time feeding, resting, and socializing  
**Reproduction:** Breeding occurs year round and is initiated by both sexes by displaying at their mate  
**Gestation:** 138 days  
**Number of offspring:** 1

## DISTRIBUTION



**CLASS** Mammalia

**ORDER** Primates

**FAMILY** Cercopithecidae

**GENUS** Pygathrix

**SPECIES** nemaeus



**Species Protection Status in Laos: Prohibition Category 1\***

\*Protection Category 1: Rare, near extinct, high-value species of special importance in the development of social-economic, environmental, educational scientific research. **It is prohibited to hunt this species anywhere and at any time in Laos**

## PHYSICAL TRAITS

**Family:** Cercopithecidae: an African or Asian monkey  
**Weight:** 9-11 kg (males), 7-10 kg (females)  
**Appearance:** Grey white and red coloration with long white whiskers around the face, and a long white tail. Males are larger and have a slightly different coloration than females.

## FUN FACT

**Red shanked doucs** are one of the most colorful species of primates, and are often called the **"queen of primates"**.





# ຂາແດງ

## ນິເວດວິທະຍາ

**ພື້ນທີ່ອາໄສ:** ໄກມເປົ້າເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ; ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນເຂດສາຍພູຫຼວງ  
ການອະນຸລັກ  
**ແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ:** ບໍາດົງດີບ, ບໍາໄມ້ໃບທີ່ປະສົມ / ບໍາໄມ້ໃບຂັ້ນ, ແລະ ບໍາທຶນປຸນ  
**ການກິນອາຫານ:** ກິນພິດໃບເປັນອາຫານ; ກິນໃບ, ພາກ, ແກ່ນພິດ, ດອກ ແລະ ເປືອກ

## ການອະນຸລັກ

**ສະຖາບະພາບການອະນຸລັກ:**  
ມີຄວາມສ່ຽງຂັ້ນວິກິດຕ່າງກຳນຸ້ມັກ

**ໄຟຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ່:** ການລ່າສັດແບບກຳນົດ ປັ້ນເໝາຍ  
ເພື່ອການບໍລິໂພກໃນທີ່ອຸ່ງຖິ່ນ ຫຼື ການຊື້ຂາຍທັງ  
ພູຍາໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບໃຊ້ເປັນຢ່າ  
ພື້ນມື່ອງ, ການຊື້ຂາຍເພື່ອເປັນສັດລ໌ຮົງ ຫຼື ເພື່ອ  
ສະໜອງຂັ້ນສັດປ່າ) ແລະ ການສູນເສຍແຫ່ງທີ່ຢູ່  
ອາໄສ

**ການປະຕິບັດການອະນຸລັກ:** ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ  
ການຕິດຕາມ, ການປົກປັກຮັກສາແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ  
ແລະ ການສຶກສາ

## ພິດຕິກຳ ແລະ ລັກສະນະທາງ ສັງຄົມ

**ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ:** ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນກ່ຽມໂຕຜູ້ທີ່ມີຈຳ  
ນວນ 6-18 ໂຕ, ໂດຍມີສັງຄົມພື້ນເຊີ້ນ-ພື້ນຊັ້ນ (ສັດ  
ມີຖານປ່ຽນກຸ່ມໃນບາງຄັ້ງ). ເຊິ່ງໂຕຜູ້ຈະມີຄວາມໂດດ  
ເດັ່ນກວ່າໄຕແມ່.

**ພິດຕິກຳ:** ອອກຫາກິນໃນຍາມກາງເວັນ ແລະ ຢູ່ຕາມ  
ຕົ້ນໄນ້. ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ກິນອາຫານ, ພັກຜ່ອນ ແລະ  
ເຂົ້າສັ່ງຄົມ

**ການສືບພັນ:** ມີການປະສົມພັນຕະຫຼອດປີ ແລະ  
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫັງສອງເພີດ ເຊິ່ງສະແດງທີ່ຄູ່ຂອງພວກ  
ມັນ

ການຖືພາ: 138 ວັນ  
ຈຳນວນລູກ: 1 ໂຕ

## ພື້ນທີ່ອາໄສ



ຊັ້ນ Mammalia

ອັນດັບ Primates

ຕະກຸນ Cercopithecidae

ສະກຸນ Pygathrix

ຊະນິດ nemaeus



CRITICALLY  
ENDANGERED

EXTINCT  
IN THE WILD  
EW  
EX

ສະພາບການປົກປັກຮັກສາພັນສັດປ່າໃນລາວ: ປະເພດທຸວງທ້າມ 1\*

\*ປະເພດຄົ້ນຄອງ 1: ຊະນິດພັນທີ່ທາຍາກ, ໄກສູນພັນ, ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດ  
ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຶງແວດລ້ອມ, ການສຶກສ້າຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ທ້າມບໍ່ໃຫ້  
ມີການລ່າສັດຂະນິດມີຕາມລໍາພັງໃຈໃນລາວ

## ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

**ຕະກຸນ:** Cercopithecidae: ລົງຈາ  
ຜູກຮັກກາ ຫຼື ລົງອາຊີ  
**ນໍ້າໜັກ:** 9-11 ກລ (ໂຕຜູ້), 7-10 ກລ  
(ໂຕແມ່)

**ລັກສະນະ:** ສີຂາວເທົາແກມແດງ ທັງມີໝວດ  
ສີຂາວຍາວເທົ່ວໃບໜ້າ, ແລະ ທາງຍາວເປັນສີ  
ຂາວ. ໂຕຜູ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໂຕແມ່ ແລະ ມີ  
ສີແຕກຕ່າງຈາກໂຕແມ່ເລັກໜ້ອຍ. ບໍ່ມີກຳນົດ  
ລະດູປະສົມພັນ.

## ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ຂາແດງເປັນສັດລ໌ຮົງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ  
ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີສີສັນຫຍາທີ່ສຸດ  
ແລະ ມັກຖືກເອີ້ນວ່າ "ລາຊີນີ" ຂອງ  
ສັດຕະກຸນລົງ (ໄພຣເມດ)

