

# SOUTHERN WHITE CHEEKED GIBBON

## ECOLOGY

**Distribution & Range:** Lao PDR and Viet Nam; endemic to the Annamite Mountains  
**Habitat:** Broadleaf evergreen forest, and both limestone and non-limestone forests  
**Diet:** Frugivorous; eat mainly fruit with some leaves and insects


## CONSERVATION

**Conservation status:**  
**Critically Endangered**  
**Major Threats:** Targeted hunting for local consumption or for national and international trade (for traditional medicine, bush meat, and the pet trade), and habitat loss  
**Conservation Action:**  
Research and monitoring, habitat protection, and education

## ACTIVITY & SOCIAL TRAITS

**Social Structure:** Unknown  
**Activity:** Arboreal and diurnal; spend their time resting, travelling, feeding, and singing  
**Reproduction:** Most likely form monogamous pair bonds  
**Gestation:** Most likely 200-212 days  
**Number of offspring:** Most likely 1

## DISTRIBUTION



**CLASS** Mammalia

**ORDER** Primates

**FAMILY** Hylobatidae

**GENUS** Nomascus

**SPECIES** siki



CRITICALLY ENDANGERED

EW

EX

EXTINCT IN THE WILD

EXTINCT

## Species Protection Status in Laos: Prohibition Category 1\*

\*Protection Category 1: Rare, near extinct, high-value species of special importance in the development of social-economic, environmental, educational scientific research. **It is prohibited to hunt this species anywhere and at any time in Laos**

## PHYSICAL TRAITS

**Family:** Hylobatidae: a lesser ape, or "gibbon"

**Weight:** 7-9 kg

**Appearance:** Males are black with white around their mouths, and females are tan with a black crown on their heads and white around their faces. They have very long arms and lack a tail

## FUN FACT

Adult male southern white cheeked gibbons are black, and adult females are brown. So, its **easy to tell which is which** if you spot one!





# ທະນີແກ້ມຂາວຖຸນໃຕ້

## ນິເວດວິທະຍາ

**ພື້ນທີ່ອາໄສ:** ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ; ມີຖຸນກຳເນີດໃນເຂດສາຍພຫງວງ  
**ແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ:** ບ້າໄມ້ໃປໃຫຍ່, ລວມທັງປ່າພູ ທຶນບູນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນທຶນບູນ; ອາໄສຢູ່ເທິງຕົ້ນໄນ້  
**ການກິນອາຫານ:** ກິນໝາກໃນເປັນອາຫານຫຼັກ; ກິນໝາກໃນເທິນີໃບ ແລະ ແມ່ງໃນເປັນຫຼັກ

## ການອະນຸລັກ

ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ:  
**ມີຄວາມສ່ຽງຂັນວິກິດດໍາການສູນພັນ**

ໄຟຂັ້ນຊັ້ນດຳ: ການລ່າສັດແບບກຳນົດບ້າໝາຍເພື່ອການບໍລິໂພກໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ການຊື່ຂາຍທັງພູຍາໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງ, ການຊື່ຂາຍເພື່ອເປັນສັດລ່ຽງ ຫຼື ເພື່ອສະໜອງຊັ້ນສັດປ່າ) ແລະ ການສູນເສຍແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ການປະຕິບັດການອະນຸລັກ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຕິດຕາມ, ການປົກປັກຮັກສາແຫ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການສຶກສາ

## ພິດຕິກຳ ແລະ ລັກສະນະທາງສັງຄົມ


**ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ:** ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

**ພິດຕິກຳ:** ອອກທາກິນໃນຍານກາງເວັນ; ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໃນກຸານພັກຜ່ອນ, ເລາເຫຼື້ນ, ກິນອາຫານ ແລະ ສັງສຽງຮ້ອງ

**ການສືບພັນ:** ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄວາມສໍາພັນແບບຜົວເໜິ້ງເມຍດຽວ

**ການຖືພາ:** ສູງສຸດປະມານ 200–212 ວັນຈຳນວນລູກ: ໄສວນໃຫຍ່ແມ່ນ 1 ໂຕ

## ພື້ນທີ່ອາໄສ



ຊັ້ນ Mammalia

ອັນດັບ Primates

ຕະກຸນ Hylobatidae

ສະກຸນ Nomascus

ຊະນິດ siki



RED LIST

< CRITICALLY ENDANGERED >

EXTINCT IN THE WILD

EXTINCT

## ສະພາບການປົກປັກຮັກສາພັນສັດປ່າໃນລາວ: ປະເພດທຸວງທ້າມ 1\*

\*ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ລ: ຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໄກສູນພັນ, ແລະ ມີມູນຄ່າສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນພື້ນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ້ງແວດລ້ອມ, ການສັກສາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ທ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການລ່າສັດຊະນິດນີ້ຕາມອຳເນີໃຈໃນລາວ

## ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

ຕະກຸນ: Hylobatidae, ລົງບໍ່ມີຫາງຊີ້ພາດນ້ອຍ ຫຼື "ທະນີ"

ນໍ້າໜັກ: 7–9 ກລ

ລັກສະນະ: ໂຕຜູ້ຈະມີລຳໂຕເປັນສິດຳ ແລະ ມີສິຂາວອ້ອມຮອບປາກ; ໂຕເພິ່ນຈະມີສິຄົມ ແລະ ມີຂະມ່ອມສິດຳຢ່າເທິງທຸວ ພ້ອມມີສິຂາວທົ່ວໃບໜ້າ. ທະນີແກ້ມຂາວຖຸນໃຕ້ມີແຂນຍາວ ແລະ ບໍ່ມີຫາງ

## ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ໂຕຜູ້ທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວຈະມີສິດຳ, ສ່ວນໂຕແມ່ທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວຈະມີສິນໍາຕານ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນເລື້ອງງ່າຍໃນການຈຳແນນກລະຫວ່າງໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ ຖ້າທ່ານພົບເຫັນທະນີດັ່ງກ່າວ

